



Instructions aux patients

1. Passez le fil dentaire puis brossez doucement les dents.
2. Déposez une mince couche de gel blanchissant dans vos gouttières de blanchiment personnalisées. Évitez de mettre trop de gel dans la gouttière. (Si vous êtes sensible au peroxyde, avant l'insertion des gouttières, appliquez une mince couche de vaseline sur la partie des gencives adjacente aux dents à blanchir.)
3. Insérez les gouttières de blanchiment et laissez s'écouler tout excédent de matériau. Essayez cet excédent.
4. Avec la formule 32 %, la procédure de blanchiment recommandée consiste en 1 traitement quotidien de 15 minutes, pendant une durée de 14 jours ou jusqu'à obtention des résultats désirés. Avec les formules 16 % et 22 %, la procédure de blanchiment recommandée consiste en 1 à 2 traitements quotidiens de 1 à 2 heures, pendant une durée de 14 jours ou jusqu'à obtention des résultats désirés.
5. Nettoyez soigneusement la gouttière après chaque usage, puis brossez-vous à nouveau les dents.
6. Rincez avec du bain de bouche sans alcool.
7. Contactez votre dentiste lorsque vous avez besoin de renouveler vos stocks de gel de blanchiment Lumibrite Take-Home Whitening Gel.

Avertissements : Garder hors de portée des enfants. Ne pas injecter ce produit. En cas d'irritation (rougeur, œdème, sensibilité) des gencives ou de la bouche, cesser l'emploi et consulter un dentiste. Ces produits contiennent des peroxydes et leur usage est déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans. L'application pendant des périodes dépassant 14 jours ne doit se faire que sous la supervision d'un dentiste. Ne pas avaler le produit ou un de ses éléments et éviter tout contact du produit avec les yeux.

Éviter tout contact direct entre la surface active du produit de blanchiment dentaire et les gencives et/ou la salive.

Entreposage : Conserver à une température ne dépassant pas 23 °C

DenMat Holdings, LLC • Lompoc, California 93436, États-Unis d'Amérique

